



Konnaosi *Equisetum fluviatile* – vars sile, pehme, 5-8 mm läbimõõduga, sageli ilma männasoksteta. Lehetuped tihedalt varre ümber, 15-30 pruuni süstjas-naaskelja pruuni hambaga, millel väga kitsas valge ääris. Kõrgus enamasti 1-1,5 m.




Räni-kardhein *Ceratophyllum demersum* – tumeroheline, männasjalt paiknevate, 1-2 korda harkjalt harunevate lehtedega, millel servas väikesed hambakesed. Õied lillakasrohelised, vähemärgatavad, üksikult lehekaenaldes. Õitseb vee all.



Vesikuusk *Myriophyllum* sp. – lehed männastes, sulgjalt harunenud. Veest väljaküündiv õisik järguline, pisikeste rohekate õitega.



Kanada vesikatk *Elodea canadensis* – enamasti umbes 1 cm pikkused ja mõne mm laiused piklikmunajad lehekesed tavaliselt kolmekaupa männastes. Õitseb harva, Eestis leitud peamiselt emastaimi. Niitjas õieraag ulatub veepinnani, õis mõne mm läbimõõduga, roosakas.



Kuuskhein *Hippuris*



Mändvetikas *Chara* sp. – mõne kuni mõnekümne cm kõrgused, suuremad liigid ka meetri pikkuste „vartega“, millele männasjalt kinnituvad „lehed“. Need erinevad oma ehituselt kõrgemate taimede vartest ja lehtedest, koosnedes telgrakkudest ja neid ümbritsevate koorerakkude kihist. Suguorganid – anteriidid ja oogoonid – asetsevad ülemiste männaste „lehtedel“. Paljude liikide puhul katab taimi märgatav lubjakirme.