





Kaelus-penikeel *Potamogeton perfoliatus* – väga muutliku välimusega liik. Kindlamaks eristustunnuseks on vart kaelusjalt ümbritseva alusega, enamasti 5-6 cm pikkused piklikmunaja kujuga lehed. Ruljas rohekate õitega tähk tihe, mõne cm pikkune.



Kamm-penikeel *Potamogeton pectinatus* – kuulub kitsalehiste penikeelte hulka. Eristub (nagu niitjas penikeelgi) enamikust teistest liikidest abilehtede puudumise poolest lehekaenaldes. Selle asemel läheb kitsaste (mõne mm laiuste) lehtede laba üle (enamasti pisut roosakat) vart ümbritsevaks tupeks, mille ülaseras on keeleke. Lehetipp alati terav (erinevalt niitjast penikeelest), tähkõisik hõre – koosneb männastest. Viljad beežikad.



Sõõr-särjesilm *Ranunculus circinatus* – liiginimi iseloomustab varrega risti asetsevaid, sõõrjaid või poolsõõrjaid, pisut jäigalt hoiduvaid peenjaguseid lehti, mis tihti ka vart ümbritsevad. Kõikidel särjesilmadel (varem eristatud kui perek. *Batrachium*) on valged, veest väljaulatuvad õied, mille läbimõõt sel liigil on 15-18 mm.



Ujuv penikeel *Potamogeton natans* – esinevad vaid pikarootsulised, kaarrootsed, laielliptilised ujulehed, mis on enamasti pruunikasrohelised. Tihe rohekas tähkõisik 4-5 cm pikkune, veest väljaküündiv.



Vesi-kirburohi *Polygonum amphibium* – Sulgrootsete rohelistes lehtedega, õitseb tavaliselt veevormina, mis on ujulehtedega. Õisik tihe roosa või valkjasroosa tähk.